



# Hautdesinfektion

Alkoholisches Hautdesinfektionsmittel zum Einreiben in die Haut



## Produktbeschreibung

**medichem Hautdesinfektion** ist ein alkoholisches, parfümfreies Desinfektionsmittel zur Anwendung auf der Haut. **medichem Hautdesinfektion** ist besonders hautverträglich. Ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe oder sonstige Zusatzstoffe, daher sehr hautverträglich. Dermatologisch empfohlen für die Hautdesinfektion bei haut- bzw. allergieempfindlichen Personen.

## Darreichungsform

Lösung zur Anwendung auf der Haut.

## Anwendungsgebiete

Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut.

Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten.

Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten\* lang feucht gehalten.

\* Gemäß VAH-Zertifikat wurde eine Einwirkzeit von 3 Minuten für die Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut bestätigt.

## Dosierungsanleitung und Art der Anwendung

Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten		15 Sek	30 Sek	1 Min.	1,5 Min.	3 Min.
Hautantiseptik						
Anwendungsempfehlung zur Hautantiseptik vor Injektionen und Punktionen*	VAH	✓				
Anwendungsempfehlung zur Hautantiseptik vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen und Hohlorganen sowie operativen Eingriffen*	VAH			✓		
Anwendungsempfehlung zur Hautantiseptik auf talgdrüsenreicher Haut*	VAH					✓
Ergänzende Prüfergebnisse						
begrenzt viruzid	EN 14476	niedrige und hohe Belastung	✓			
mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	EN 14348	niedrige und hohe Belastung		✓		

\* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

ergänzende Prüfergebnisse			15 Sek	30 Sek	1 Min	1,5 Min	3 Min
wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	niedrige und hohe Belastung	✓				
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige und hohe Belastung			✓		
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige und hohe Belastung	✓				
bakterizid	EN 13727	niedrige und hohe Belastung	✓				
levurozid (Candida albicans)	EN 13624	niedrige und hohe Belastung	✓				

\* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

## Hautdesinfektion

### Gegenanzeigen

medichem Hautdesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

### Nebenwirkungen

Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

### Zusammensetzung

In 100 g Lösung sind enthalten:

Wirksamer Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g, sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser

### Produktstatus

Zugelassen nach AMG (Arzneimittelgesetz) in Deutschland. Zul.-Nr. 1599.98.99.

### Warnhinweise

Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Produkt Daten	
Produkt	Best.-Nr.
250 ml Sprühflasche	MCHE9800
500 ml Flasche	MCHE9810
1000 ml Flasche	MCHE9820
5 L Kanister	MCHE9830

### [www.medichem-online.de](http://www.medichem-online.de)

Wirkstoff: 2-Propanol 70% (V/V). Alkoholische Hautdesinfektion.

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 63,1 g 2-Propanol. Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut. Gegenanzeigen: Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut Rötungen und leichtes Brennen möglich. Warnhinweise: Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie die Beseitigung von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden. Stand: 02/2022.

Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, Tel. 05664/9496-0, info@schumacher-online.com.